

## **Non-classical Comparative Logic I: Standard Categorical Logic – from SL<sub>e</sub> to IFL<sub>e</sub>**

**Amer Amikhteh\***

**Seyed Ahmad MirSanee\*\***

### **Abstract**

In this paper, a non-classical axiomatic system was introduced to classify all moods of Aristotelian syllogisms, in addition to the axiom "Every a is an a" and the bilateral rules of obversion of E and O propositions. This system consists of only 2 definitions, 2 axioms, 1 rule of a premise, and moods of Barbara and Datisi. By adding first-degree propositional negation to this system, we prove that the square of opposition holds without using many of the other rules of classical logic (including double negation elimination). We then show that the Propositional Substructural Logic SL<sub>e</sub> is the best logic to study Aristotelian Syllogisms. Also, based on the IFL<sub>e</sub> square of opposition, the rules of conversation and the rules of negation are completely proved in Muzaffar's logic. For this purpose, we used the monadic first-order logic with the same standard deductive apparatus of quantifiers in classical logic, plus the axioms of "some a is an a" and "some not-a is a not-a". Finally, to show that there is no existential commitment to general terms in categorical logic, the Strong Four-Valued Relevant-classical Logic KR4 was used. With the same existential interpretation of the quantifiers and the standard translation of the quarter quantified.

**Keywords:** Categorical logic, Aristotelian syllogism, non-classical logic, Substructural logic, Axiomatic method.

---

\* PhD in Logic, Tarbiat Modares University (Corresponding Author), amer.amikhteh@modares.ac.ir.

\*\* PhD student in Philosophy, Logic, Tarbiat Modares University, sa.mir@modares.ac.ir.

Date received:24/05/2021 , Date of acceptance:24/08/2021

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.



## منطق تطبیقی غیرکلاسیک ۱: منطق حملی استاندارد - از $SL_e$ تا $IFL_e$

عامر آمیخته\*

سیداحمد میرصانعی\*\*

### چکیده

در این مقاله برای اصل بنده تمام ضربهای قیاس‌های ارسطوبی به علاوه اصل «هر الف الف است» و قواعد دولطوفی نقض محمول سالبه‌ها، یک سیستم اصل موضوعی غیرکلاسیک معرفی شد. این سیستم تنها شامل ۲ تعریف، ۲ اصل، ۱ قاعده‌ی یک مقدمه‌ای و ضربهای Barbara و Datisi است. با افزودن نقض گزاره‌ای درجه اول به این سیستم، اثبات کردیم که مربع تقابل بدون استفاده از بسیاری از قواعد منطق کلاسیک (از جمله حذف نقض مضاعف) برقرار است. سپس نشان دادیم که منطق گزاره‌های زیرساختاری  $SL_e$  برای قیاس‌های ارسطوبی کافی است. همچنین بر پایه‌ی  $IFL_e$  مربع تقابل، قواعد عکس و قواعد نقض در منطق مظفر به طور کامل ثابت می‌شوند. برای این منظور از منطق کلاسیک به علاوه اصول «بعضی الف الف است» و «بعضی غیرالف غیرالف است» بهره بردیم. در نهایت، برای نشان دادن عدم تعهد وجودی نسبت به نامهای عام در منطق حملی با همان تغییر وجودی از سورها و ترجمه‌ی استاندارد محصورات اربعه از منطق چهار-ارزشی ربط-کلاسیک قوی<sup>۴</sup> استفاده شد.

**کلیدواژه‌ها:** منطق حملی، قیاس ارسطوبی، منطق غیرکلاسیک، منطق زیرساختاری، روش اصل موضوعی.

\* دکترای فلسفه، گرایش منطق، دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول)، amer.amikhteh@modares.ac.ir

\*\* دانشجوی دکری فلسفه، گرایش منطق، دانشگاه تربیت مدرس، sa.mir@modares.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

## ۱. مقدمه

در تحلیل منطق قدیم (ستی) توسط منطق جدید رویکرد غالب این است که اولاً از منطق مرتبه اول کلاسیک (=فرگه) و نیز منطق‌های توسعه یافته‌ی موجهات و زمان استفاده می‌شود، ثانیاً در تحلیل نحوی (نظریه برهانی) از روش استنتاج طبیعی استفاده می‌شود.

گرچه ابزار منطق کلاسیک بسیار کارآمد است. اما با ظهور طیف گسترده‌ای از منطق‌های غیرکلاسیک بالاخص «منطق‌های زیرساختاری» (substructural logics) که امروزه داریم، منطق فرگه بسیار قوی است و پیامدهای فلسفی سنگینی برای ما خواهد داشت. به عنوان مثال شکل استاندارد «برهان خلف» در تعداد قابل توجهی از منطق‌های غیرکلاسیک مانند منطق شهودی و حتی منطق ربط R پذیرفته نیست. ما نشان خواهیم داد که برای اثبات «قیاس‌های حملی ارسطوبی» (Aristotelian categorical syllogisms) نه نیازی به برهان خلف و نه نیازی به قاعده‌ی  $\neg\phi \vdash \neg\psi$  داریم.

به علاوه ازین رهگذر یعنی بهره‌گیری از منطق‌های غیرکلاسیک به عنوان یک نتیجه‌ی فلسفی اصلی ما ثابت خواهیم کرد که منطق حملی ارسطوبی با همان تعییر وجودی از سورها مانند منطق فرگه، نسبت به نامهای عام تعهد وجودی ندارد.

همانطور که می‌دانیم گرچه روش استنتاج طبیعی در مقام کاربرد به ویژه در عرصه‌ی آموزش بسیار حائز اهمیت است؛ اما در مقام تاسیس، بحث‌های نظری و تخصصی‌تر، مناسب‌تر است که از روش اصل موضوعی استفاده کنیم.

در تعریف استاندارد در «منطق جبری مجرد» (abstract algebraic logic)، هر منطق مجموعه‌ای از استدلال‌ها (consecutions) در یک زبان خاص با ویژگی‌های خاص است. ما این مجموعه را می‌توانیم از طریق روش‌های مختلف نحوی و معنایی تعیین کنیم. در این مقاله AL را یک سیستم اصل موضوعی برای منطق L می‌گیریم اگر و تنها اگر تنها توسط زیر مجموعه‌ای از L تعیین شود. بنابراین در AL نه خبری از فرض، برهانک و سطرهای ابتناء است و نه خبری از فراؤاعدی مانند  $\vdash_{AL\Phi_X} \vdash_{AL\Delta_X\Phi_X}$  است.

در بخش اول مقاله ابتدا سیستم‌های اصل موضوعی C2، C4، C6 و C8 که فاقد قواعد «حذف نقض مضاعف» (double-negation elimination) و «برهان خلف» هستند را برای قیاس‌های ارسطوبی معرفی می‌کنیم. سپس با افزودن حذف نقض مضاعف و

نقض گزاره‌ای درجه اول سیستم‌های اصل موضوعی قوی‌تری معرفی می‌کنیم و نشان می‌دهیم که «مربع تقابل» (square of opposition) بدون حذف نقض مضاعف مانند قبل (در منطق ارسطویی) پابرجا است. در نهایت C14 که شامل منطق مظفر (به بیان (فلاحی ۱۳۸۹)) و قوی‌ترین منطق حملی این مقاله است را معرفی می‌کنیم.

در بخش دوم ابتدا نشان می‌دهیم که C8 تنها با استفاده از منطق مرتبه اول یک موضعی غیرآزاد بر پایه‌ی منطق گزاره‌ای زیرساختاری جابه‌جایی یکانه نتیجه‌ی (single-conclusion) SLe که فاقد قواعد ساختاری شرکت‌پذیری (associativity)، انقباض (contraction) و تضعیف (weakening) است، بدست می‌آید. در ادامه نیز C14 را با منطق زیرساختاری جابه‌جایی شرکت‌پذیر چندگانه نتیجه‌ی (multiple-conclusion) IFLe اثبات می‌کنیم.

در نهایت توسط نسخه‌ی ۴ ارزشی منطق ربط  $\varphi \rightarrow \psi = R+(\varphi \wedge \neg\varphi) \rightarrow KR$ ، عدم تعهد وجودی نسبت به نام‌های عام در منطق حملی ارسطویی را نشان می‌دهیم. این ادعا را با همان «تعییر وجودی از سورها»، «تعهد وجودی نسبت به نام‌های خاص» و «ترجمه‌ی استاندارد محصورات اربعه» در منطق فرگه ثابت خواهیم کرد.

## ۲. روشناسی و پیشینه تحقیق

در (فلاحی ۱۳۸۹) به خوبی توضیح داده شده است که منطق حملی قدیم منحصر در یک سیستم منطقی نمی‌شود. بنابراین قبل از پرداختن به مباحث منطق تطبیقی ابتدا باید مشخص شود که موضوع بحث دقیقاً در مورد کدام سیستم از منطق قدیم است.

از طرفی هر کدام از سیستم‌های منطق جدید دارای ویژگی‌های اساسی زیر است:

۱. زبان صوری دقیق و در نتیجه دستگاه استنتاجی دقیق و بدون ابهام دارد.

۲. تمایز نحو و معنا در آن رعایت می‌شود.

بنابراین قبل از آغاز مباحث تطبیقی می‌بایست سیستم منطقی مورد بحث در حوزه‌ی منطق قدیم با معیارهای صوری منطق جدید تطابق پیدا کند. و تنها پس از آن است که این دو نظام منطقی را می‌توانیم به شکل اصولی با هم مقایسه کنیم.

CL $\forall^*$  را «منطق مرتبه اول فرگه» به علاوه‌ی اصل‌نمای زیر بگیرید:

- اگر  $\varphi$  یک محمول‌نشانه باشد، آنگاه  $\exists x\varphi x$  و  $\exists x\neg\varphi x$  اصل موضوع هستند.

به عنوان مثال در (فلاسحی ۱۳۸۷) به درستی بیان می‌شود که در  $\text{CL}^{\forall}$  با ترجمه‌ی استاندارد محصورات اربعه، تمام قیاس‌های ارسطویی، مربع تقابل، قواعد عکس و نقض در منطق مظفر برای محمول‌های بسیط و نقیضشان به طور کامل به دست می‌آیند.

سپس اشکال می‌شود که:

«اگر محصورات اربع را با محمول‌های مرکب، که معادل محمول‌نشانه‌ها نیستند، به کار ببریم همه اشکالات بر می‌گردد زیرا اصول موضوعه منطق وحید تنها برای محمول‌نشانه‌ها برقرار است و محمول‌های مرکب را شامل نمی‌شود»

به عنوان مثال:

بنابراین قاعده‌ی تداخل برای گزاره‌هایی مانند «هر سیب زرد خوشمزه است» ( $S$ ) از دست می‌رود. اما این اشکال دقیقاً بر می‌گردد به استفاده از «زبان طبیعی» به جای «زبان صوری». گرچه در مبحث الفاظ ترکیب وصفی «سیب زرد» لفظ مرکب ناقص محسوب می‌شود اما این ترکیب در سیستم منطقی نمود پیدا نکرده است. به عنوان مثال استدلال زیر به دلیل عدم تکرار حد وسط در منطق قدیم متوجه نیست:

$\exists x[Ax \wedge Bx \wedge Cx]$	بعضی میوه‌ها سیب زرد هستند.
$\forall x(Bx \rightarrow Dx)$	هر سیب خوشمزه است.
$\therefore \exists x(Ax \wedge Dx)$	بنابراین: بعضی میوه‌ها خوشمزه‌اند.

اگر منطق حملی مظفر به صورت کاملاً صوری بیان شود، می‌بایست  $S$  با نمادهایی مانند  $AaB$  صوری شود که  $A$  محمول «سیب زرد» باشد. اما اگر بخواهیم  $S$  را به صورت  $(AB)aC$  صوری کنیم، مثلاً باید قاعده‌هایی مانند قاعده‌ی زیر در سیستم خود داشته باشیم:

$AaC$	هر سیب خوشمزه است.
$\therefore (AB)aC$	بنابراین هر سیب زرد خوشمزه است.

در غیراینصورت در واقع عملاً «سیب زرد» را باید یک محمول بسیط تلقی کرد نه مرکب. این در حالی است که چنین قاعده‌ای در منطق حملی مظفر وجود ندارد. حتی در قاعده‌ی بدیهی منطقی هم کلمه به هر دو طرف گزاره افزوده می‌شود. ازین رو در منطق جدید نیز  $S$  باید به صورت  $\forall x(Ax \rightarrow Bx)$  نمادین شود.

بنابراین صوری‌سازی منطق قدیم با معیار منطق جدید از ملزومات مباحثت منطق تطبیقی است. فقدان این صوری‌سازی یکی از مهم‌ترین ضعف‌های پژوهش‌های انجام شده در ایران در حوزه‌ی «منطق تطبیقی» است.

این در حالی است که در جهان می‌توان موارد زیادی از این رویکرد یافت. به عنوان مثال لوکاسیه‌ویچ در کتاب معروف (Lukasiewicz 1957) یک سیستم کاملاً صوری از منطق حملی ارسطو ارائه می‌دهد. بعضی سیستم‌های اصل موضوعی دیگر نیز در (Kulicki 2020) گزارش داده شده‌اند.

منطق حملی لوکاسیه‌ویچ که در (حیدری ۱۳۸۹) نیز معرفی شده است بر پایه منطق گزاره‌های فرگه است. در حالت کلی قرار دادن یک منطق زمینه، آن هم منطق گزاره‌های فرگه و نسبت دادن آن به منطق‌دانان قدیم توجیه‌پذیر نیست.

بنابراین اگر بخواهیم نگاه دقیق‌تری به نظام منطق قدیم و جدید داشته باشیم، مباحث منطق تطبیقی را می‌بایست در دو مرحله‌ی اصلی زیر پی‌گیری کنیم:

۱. مرحله‌ی اول (سیستم‌سازی): معرفی یک سیستم صوری با معیارهای منطق جدید مانند  $S_{TL}$  از نظام منطق قدیم مورد نظر بدون منطق زمینه.

۲. مرحله‌ی دوم (تطبیق سیستم قدیم و جدید):

- a. انتخاب یکی از سیستم‌های منطق جدید مانند  $S_{ML}$

- b. ترجمه‌ی زبان صوری  $S_{TL}$  به زبان صوری  $S_{ML}$

- c. بررسی تبعات منطقی این ترجمه

فیلسوفان در این که  $S_{TL}$  تا چه حد با سیستم‌های منطق قدیم تطابق دارد، می‌توانند با هم وارد گفتگو شوند. اما ما ترجیح می‌دهیم بدون اینکه متعهد به یک منطق خاص شویم، به مباحث منطق تطبیقی پردازیم. به عبارتی مباحث را با رویکرد فرامنطقی اما صوری و نه فلسفی دنبال می‌کنیم.

### ۳. منطق حملی

#### ۱. زبان صوری

##### ۱.۱.۳ واژگان

A,B,C,...

a. شماراتا محمول نشانه:

مجموعه‌ی همه‌ی محمول نشانه‌ها را با  $\mathcal{P}$  نشان می‌دهیم.

a,i,e,o

b. نشانه‌های حملی:

'

c. ادات سلب:

##### ۲.۱.۳ قواعد ساخت

a. اگر  $\pi$  یک محمول نشانه باشد آنگاه  $\pi$  یک محمول است.

b. اگر  $\pi$  یک محمول باشد آنگاه  $'\pi$  یک محمول است.

مجموعه‌ی همه‌ی محمول‌ها را با  $\mathcal{P}'$  نشان می‌دهیم.

c. اگر  $\pi$  و  $\rho$  یک محمول باشند آنگاه  $\pi \text{tap}$   $\pi \text{er}$  و  $\pi \text{op}$  یک فرمول و یک گزاره‌ی حملی هستند.

مجموعه‌ی همه‌ی فرمول‌های این زبان صوری را با  $Fm_C$  نشان خواهیم داد.

جدول ۱.۳. نشانه‌گذاری قرون وسطایی در گزاره‌های حملی ارسطو

نوع حمل	نماد	گزاره‌ی حملی	نشانه‌گذاری
موجبه کلیه	A	هر الف ب است	AaB
سالبه کلیه	E	هیچ الف ب نیست	AeB
موجبه جزئیه	I	بعضی الف ب است	AiB
سالبه جزئیه	O	بعضی الف ب نیست	AoB

منطق تطبیقی غیرکلاسیک ۱: ... (عامر آمیخته و سیداحمد میرصانعی) ۹

### جدول ۲.۳. قیاس‌های حملی ارسطویی

شکل اول

Barbara	(A <sub>1</sub> ):	παρ	,	ρασ	⊦	πασ
Barbari	(A <sup>*</sup> <sub>1</sub> ):	παρ	,	ρασ	⊦	πισ
Celarent	(A <sub>2</sub> ):	παρ	,	ρεσ	⊦	πεσ
Celaront	(A <sup>*</sup> <sub>2</sub> ):	παρ	,	ρεσ	⊦	ποσ
Darii	(A <sub>9</sub> ):	πιρ	,	ρασ	⊦	πισ
Ferio	(A <sub>10</sub> ):	πιρ	,	ρεσ	⊦	ποσ

شکل دوم

Cesare	(B <sub>2</sub> ):	παρ	,	σερ	⊦	Πες
Cesaro	(B <sup>*</sup> <sub>2</sub> ):	παρ	,	σερ	⊦	Πος
Camestres	(B <sub>5</sub> ):	περ	,	σαρ	⊦	Πες
Camestrop	(B <sup>*</sup> <sub>5</sub> ):	περ	,	σαρ	⊦	Πος
Festino	(B <sub>10</sub> ):	πιρ	,	σερ	⊦	Πος
Baroco	(B <sub>13</sub> ):	πορ	,	σαρ	⊦	Πος

شکل سوم

Darapti	(C <sup>*</sup> <sub>1</sub> ):	ραπ	,	ρασ	⊦	πισ
Felapton	(C <sup>*</sup> <sub>2</sub> ):	ραπ	,	ρεσ	⊦	ποσ
Disamis	(C <sub>3</sub> ):	ραπ	,	ρισ	⊦	πισ
Bocardo	(C <sub>4</sub> ):	ραπ	,	ροσ	⊦	ποσ
Datisi	(C <sub>9</sub> ):	ριπ	,	ρασ	⊦	πισ
Ferison	(C <sub>10</sub> ):	ριπ	,	ρεσ	⊦	ποσ

شکل چهارم

Bramantip	(D <sup>*</sup> <sub>1</sub> ):	ραπ	,	σαρ	⊦	Πις
Fesapo	(D <sup>*</sup> <sub>2</sub> ):	ραπ	,	σερ	⊦	Πος
Dimaris	(D <sub>3</sub> ):	ραπ	,	σιρ	⊦	Πις
Camenes	(D <sub>5</sub> ):	ρεπ	,	σαρ	⊦	πεσ
Camenop	(D <sup>*</sup> <sub>5</sub> ):	ρεπ	,	σαρ	⊦	ποσ
Fresison	(D <sub>10</sub> ):	ριπ	,	σερ	⊦	ποσ

### ۲.۳ سیستم اصل موضوعی منطق‌های حملی پایه

$$- C1 =_{df} (A_1) + (A_2) + (A_9) + (A_{10}) + (B_{13}) + (C_4) +$$

$$(SC_1): \sigma\pi\vdash\pi\epsilon\sigma + (SC_2): \sigma\pi\vdash\pi\epsilon\sigma$$

$$- C2 =_{df} C1 + (Su_1): \pi\alpha\sigma\vdash\pi\epsilon\sigma + (Su_2): \pi\epsilon\sigma\vdash\pi\epsilon\sigma$$

در جدول زیر برخان بقیه‌ی ضرب‌های ۲۴ گانه‌ی ارسطویی را به طور خلاصه آوردیم:

### جدول ۳.۳. اثبات دیگر ضروب در C1 و C2

	3.	4.	5.
A <sup>*</sup> <sub>1</sub>	1,2, A <sub>1</sub>	3, Su <sub>1</sub>	
A <sup>*</sup> <sub>2</sub>	1,2, A <sub>2</sub>	3, Su <sub>2</sub>	
B <sub>2</sub>	2, SC <sub>1</sub>	1,3, A <sub>2</sub>	
B <sub>5</sub>	1, SC <sub>1</sub>	2,3, A <sub>2</sub>	4, SC <sub>1</sub>
B <sub>10</sub>	2, SC <sub>1</sub>	1,3, A <sub>10</sub>	
B <sup>*</sup> <sub>2</sub>	1,2, B <sub>2</sub>	3, Su <sub>2</sub>	
B <sup>*</sup> <sub>5</sub>	1,2, B <sub>5</sub>	3, Su <sub>2</sub>	
C <sub>3</sub>	2, SC <sub>2</sub>	1,3, A <sub>9</sub>	4, SC <sub>2</sub>
C <sub>9</sub>	1, SC <sub>2</sub>	2,3, A <sub>9</sub>	

  

	3.	4.	5.
C <sub>10</sub>	1, SC <sub>2</sub>	2, SC <sub>1</sub>	3,4, B <sub>10</sub>
C <sup>*</sup> <sub>1</sub>	1, Su <sub>1</sub>	2,3, C <sub>9</sub>	
C <sup>*</sup> <sub>2</sub>	2, Su <sub>2</sub>	1,3, C <sub>4</sub>	
D <sub>3</sub>	1,2, A <sub>9</sub>	3, SC <sub>2</sub>	
D <sub>5</sub>	1,2 A <sub>2</sub>	3, SC <sub>1</sub>	
D <sub>10</sub>	1, SC <sub>2</sub>	2, SC <sub>1</sub>	3,4, A <sub>10</sub>
D <sup>*</sup> <sub>1</sub>	2, Su <sub>1</sub>	1,3, D <sub>3</sub>	
D <sup>*</sup> <sub>2</sub>	1, Su <sub>1</sub>	2,3, D <sub>10</sub>	
D <sup>*</sup> <sub>5</sub>	1,2, D <sub>5</sub>	3, Su <sub>2</sub>	

### ۳.۳ افزودن نقض محمول E و O

در ترجمه‌ی استاندارد محصورات اربعه به منطق جدید جمله‌های به فرم «-غیرب است» و «-ب نیست» یک گزاره هستند. بنابراین از آنجا که در این مقاله ترجمه‌ی استاندارد را مدنظر داریم، زبان صوریمان را با BNF زیر اصلاح می‌کنیم:

$$\begin{array}{ll} \pi ::= A \mid \pi' & \varphi ::= \pi a \sigma \mid \pi i \sigma \\ - (D_1): \pi e \sigma =_{df} \pi a \sigma' & (D_2): \pi o \sigma =_{df} \pi i \sigma' \end{array}$$

در این زبان صوری با توجه به تعریف‌های (D<sub>1</sub>) و (D<sub>2</sub>) قواعد A<sub>2</sub>, A<sub>10</sub>, C<sub>4</sub>, Su<sub>2</sub> به ترتیب دقیقاً همان قواعد A<sub>1</sub>, A<sub>9</sub>, C<sub>3</sub>, Su<sub>1</sub> هستند. بنابراین در این زبان زاید هستند و به دو سیستم اصل موضوعی اکیداً قوی‌تر زیر می‌رسیم:

$$\begin{array}{l} C3 =_{df} (A_1) + (A_9) + (B_{13}) + (SC_1) + (SC_2) \\ - C4 =_{df} C3 + (Su_1) \end{array}$$

### ۴.۳ افزودن عکس نقیض A

$$\begin{array}{l} C5 =_{df} (A_1) + (A_9) + (SC_1) + (SC_2) + (NC_1): \sigma a \pi \vdash \pi' a \sigma' \\ - C6 =_{df} C5 + (Su_1) \end{array}$$

قاعده‌ی B<sub>13</sub> به ترتیب تنها با قواعد NC<sub>1</sub> و A<sub>9</sub> بدست می‌آید.

### ۵.۳ افزودن اصل «هر الف الف است»

$$\begin{array}{l} C7 =_{df} (A_1) + (C_9) + (SC_1) + (Id): \pi a \pi \\ - C8 =_{df} C7 + (Id^*): \pi i \pi \end{array}$$

توجه کنید که (Id<sup>\*</sup>) تنها با اعمال قاعده Su<sub>1</sub> بر روی اصل Id بدست می‌آید. بنابراین درواقع ما به سیستم‌های قبل فقط Id را افزوده‌ایم.

منطق تطبیقی غیرکلاسیک ۱: ... (عامر آمیخته و سیداحمد میرصانعی) ۱۱

جدول ۴.۳. اثبات قواعد A<sub>9</sub>, SC<sub>2</sub>, NC<sub>1</sub>, Su<sub>1</sub> در C<sub>7</sub> و C<sub>8</sub>

(SC <sub>2</sub> ): σιπτ-πσισ	(NC <sub>1</sub> ): σαπτ-π'ασ'	(A <sub>9</sub> ): πιρ, παστ-πισ			
1. σιπ 2. σασ 3. πισ	Pre Id 1,2, C <sub>9</sub>	1. σαπ 2. π'απ' 3. παπ'' 4. σαπ''	Pre Id 1,2, C <sub>9</sub>	1. πιρ 2. πασ 3. πιπ 4. πισ	Pre Pre 1, SC <sub>2</sub> 2,3, C <sub>9</sub>
(Su <sub>1</sub> ): σαπτ-πσιπ					
1. σαπ 2. πιπ 3. σιπ	Pre Id* 1,2, A <sub>9</sub>	5. π'ασ'	4, SC <sub>1</sub>		

اگر بخواهیم فقط از ضرب شکل اول استفاده کنیم، تنها کافی است که به جای ضرب Darii ضرب Datisi و قاعده عکس مستوی SC<sub>2</sub> را جایگزین کنیم.

تا اینجا نشان دادیم که C<sub>8</sub> یک سیستم اصل موضوعی برای قیاس‌های ارسطوبی به علاوه اصل (Id) و تعريف E و O بر مبنای قواعد دوطرفه‌ی نقض محمول است. به عبارتی نشان دادیم که قیاس‌های ارسطوبی تنها با «۲ تعريف»، «۲ اصل»، «۱ مقدمه‌ای» و «۲ قاعده‌ی دو مقدمه‌ای» قابل صورت‌بندی است. در ادامه منطق‌های قوی‌تری معرفی می‌کنیم که برای اثبات قیاس‌های ارسطوبی به آن‌ها نیازی نداریم.

### ۶.۳ منطق‌های حملی برگشتی

$$- Ci+2 =_{df} Ci + (\text{Inv}): \pi''\alpha\pi \quad i \in \{7,8\}$$

توجه کنید که اصل Inv نقض محمول اصل Id به فرم  $\pi''\alpha\pi'$  است.

جدول ۶.۳. وضعیت قواعد عکس و نقض

نفع ثامن	نفع معمول	نفع محمول	نفع منفعت	نفع موجع	نفع مستوی	
→ ←	→ ←	→ ←	→ ←	→ ←	→ ←	رفت / برگشت:
× C <sub>6</sub>	× C <sub>6</sub>	C <sub>9</sub> C <sub>7</sub>	C <sub>9</sub> C <sub>5</sub>	C <sub>9</sub> C <sub>5</sub>	×	هر الف ب است
× C <sub>8</sub>	×	C <sub>3</sub>	×	C <sub>8</sub>	C <sub>1</sub>	هیچ الف ب نیست
×	×	C <sub>9</sub> C <sub>7</sub>	×	×	C <sub>1</sub>	بعضی الف ب است
×	×	C <sub>3</sub>	C <sub>9</sub> C <sub>7</sub>	C <sub>9</sub> C <sub>7</sub>	×	بعضی الف ب نیست

## ۴. افزودن نقض گزاره‌ای درجه اول به منطق حملی

### ۱.۴ زبان صوری

زبان صوری قبل را با واژه  $\sim$  و قاعده‌ی ساخت زیر بسط می‌دهیم:

- اگر  $\varphi$  یک گزاره‌ی حملی باشد، آنگاه  $\sim\varphi$  یک فرمول است.

مجموعه‌ی همه فرمول‌های این زبان صوری را با  $Fm_C$  نشان می‌دهیم.

### ۲.۴ سیستم اصل موضوعی

#### جدول ۱.۴. قواعد نقض گزاره‌ای

(A <sub>17</sub> ):	$\pi\alpha\rho, \sim\pi\alpha\sigma\vdash\sim\pi\alpha\sigma$	(A <sub>18</sub> ):	$\sim\pi\alpha\sigma, \pi\alpha\sigma\vdash\sim\pi\alpha\rho$
(QN <sub>1</sub> ):	$\sim\pi\dot{\alpha}\rho\vdash\pi\dot{\alpha}\rho$	(QN <sub>2</sub> ):	$\pi\dot{\alpha}\rho\vdash\sim\pi\dot{\alpha}\rho$
(QN <sub>3</sub> ):	$\pi\alpha\rho\vdash\sim\pi\alpha\rho$	(SC <sub>3</sub> ):	$\sim\pi\alpha\sigma\vdash\sim\sigma\alpha\pi$
(QN <sub>4</sub> ):	$\pi\alpha\sigma\vdash\sim\pi\alpha\sigma$	(QN <sub>5</sub> ):	$\pi\dot{\alpha}\rho\vdash\sim\pi\dot{\alpha}\rho$
(QN <sub>6</sub> ):	$\sim\pi\alpha\sigma\vdash\pi\alpha\sigma$	(QN <sub>7</sub> ):	$\sim\pi\alpha\rho\vdash\pi\alpha\rho$
(QN <sub>8</sub> ):	$\sim\pi\dot{\alpha}\rho\vdash\pi\dot{\alpha}\rho$		

$$- Ci+4 =_{df} Ci + (QN_{1,2,4}) + (A_{17,18}) + (SC_3); \quad i \in \{7,8\}$$

$$- Ci+4 =_{df} Ci + (QN_{1,2,4,7}); \quad i \in \{9,10\}$$

قضیه ۱: C13 و C14 به ترتیب گسترش‌های C11 و C12 هستند.

#### جدول ۲.۴. استدلال‌های اثبات‌پذیر در C11 و C13

(QN <sub>6</sub> ): $\sim\pi\alpha\sigma\vdash\pi\alpha\sigma$	(QN <sub>3</sub> ): $\pi\alpha\rho\vdash\sim\pi\alpha\rho$	(A <sub>17</sub> ): $\pi\alpha\rho, \sim\pi\alpha\sigma\vdash\sim\pi\alpha\sigma$
1. $\sim\pi\dot{\alpha}'$ Pre	1. $\pi\alpha\rho$ Pre	1. $\pi\alpha\rho$ Pre
2. $\pi\alpha\rho''$ 1, QN <sub>1</sub>	2. $\rho'\alpha'$ Id	2. $\sim\pi\alpha\sigma$ Pre
3. $\rho''\alpha\rho$ Inv	3. $\pi\alpha\rho''$ 1,2, B <sub>2</sub>	3. $\pi\alpha\sigma'$ 2, QN <sub>7</sub>
4. $\pi\alpha\rho$ 2,3, A <sub>1</sub>	4. $\sim\pi\dot{\alpha}'$ 2, QN <sub>2</sub>	4. $\rho\alpha'$ 1,3, C <sub>3</sub>
		5. $\sim\pi\alpha\sigma$ 4, QN <sub>4</sub>
(QN <sub>5</sub> ): $\pi\dot{\alpha}\rho\vdash\sim\pi\dot{\alpha}\rho$		
	1. $\pi\dot{\alpha}\rho$ Pre	1. $\sim\pi\alpha\sigma$ Pre
	2. $\rho'\alpha'$ Id	2. $\pi\alpha\sigma$ Pre
	3. $\pi\dot{\alpha}\rho''$ 1,2, B <sub>10</sub>	3. $\pi\alpha\sigma'$ 1, QN <sub>7</sub>
	4. $\sim\pi\alpha\rho'$ 3, QN <sub>4</sub>	4. $\pi\dot{\alpha}\rho'$ 2,3, B <sub>13</sub>
(QN <sub>8</sub> ): $\sim\pi\dot{\alpha}\rho\vdash\pi\dot{\alpha}\rho$	(SC <sub>3</sub> ): $\sim\pi\alpha\sigma\vdash\sim\sigma\alpha\pi$	(A <sub>18</sub> ): $\sim\pi\alpha\sigma, \pi\alpha\sigma\vdash\sim\pi\alpha\rho$
1. $\sim\pi\alpha\rho'$ Pre	1. $\sim\pi\alpha\sigma$ Pre	
2. $\pi\dot{\alpha}\rho''$ 1, QN <sub>7</sub>	2. $\pi\alpha\sigma$ Pre	
3. $\rho''\alpha\rho$ Inv	3. $\pi\alpha\sigma'$ 1, QN <sub>7</sub>	
4. $\pi\dot{\alpha}\rho$ 2,3, A <sub>9</sub>	4. $\pi\dot{\alpha}\rho'$ 2,3, B <sub>13</sub>	
	5. $\sim\pi\alpha\rho$ 4, QN <sub>4</sub>	
(SC <sub>3</sub> ): $\sim\pi\alpha\sigma\vdash\sim\sigma\alpha\pi$		
	1. $\sim\pi\alpha\sigma$ Pre	
	2. $\pi\alpha\sigma$ 1, QN <sub>8</sub>	

منطق تطبیقی غیرکلاسیک ۱: ... (عامر آمینخنه و سیداحمد میرصانعی) ۱۳

- |    |                   |                    |
|----|-------------------|--------------------|
| 3. | $\sigma i\pi$     | 2, SC <sub>2</sub> |
| 4. | $\sim\sigma e\pi$ | 3, QN <sub>5</sub> |

C14 ضعیف‌تر از سیستم استنتاج طبیعی معرفی شده در (نبوی ۱۳۷۶) و (نبوی ۱۳۸۵، ۱۰۱-۹۱) است. دستگاه استنتاجی ارائه شده شامل ۲۰ قاعده زیر است:

۱. ضرب Ferio

۲. دو قاعده تداخل

۳. هشت قاعده نقض المحمول

۴. هشت قاعده نقض سور

۵. قاعده برهان خلف

(EFQ): AiB, BeA  $\vdash$  CaD

به عنوان مثال، در سیستم نبوی:

مسئله باز ۱: آیا  $\varphi \vdash \psi + \varphi, \sim\varphi \vdash \psi$  یک سیستم اصل موضوعی برای سیستم نبوی است؟

#### ۳.۴ مربع تقابل

مربع تقابل در منطق L را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

- تداخل:  $\varphi \vdash_L \psi$  or  $\psi \vdash_L \varphi$

- تضاد:  $\exists \chi: \varphi, \psi \vdash_L \chi \sim \chi$

- داخل در تضاد:  $\exists \chi: \sim\varphi, \sim\psi \vdash_L \chi \sim \chi$

- تناقض = تضاد + داخل در تضاد

جدول ۳.۴. مربع تقابل

$\varphi$	$\psi$	تناقض	داخل در تضاد	تضاد	داخل	$\varphi \vdash_L \psi$ or $\psi \vdash_L \varphi$
$\pi\varrho$	$\pi\varphi$	$\times$	C11	C11	C11	
$\pi\varrho$	$\pi\varrho$	$\times$	C11	C11	C11	
$\pi\varrho$	$\pi\varphi$	$\times$	C12	$\times$	$\times$	
$\pi\varphi$	$\pi\varrho$	$\times$	$\times$	C12	$\times$	
$\pi\varrho$	$\pi\varphi$	C2	$\times$	$\times$	$\times$	
$\pi\varphi$	$\pi\varrho$	C2	$\times$	$\times$	$\times$	

- |  |                      |     |                           |                      |
|--|----------------------|-----|---------------------------|----------------------|
| $\sim\pi\varrho, \sim\pi\varrho \vdash_{C11} \pi\varrho, \sim\varrho'\varrho'$ | 2. $\sim\pi\varphi'$ | Pre | 4. $\sim\varrho\varrho''$ | 1,3, A <sub>17</sub> |
| 1. $\sim\pi\varrho$  | Pre                  |     | 3. $\pi\varrho''$         | 3, QN <sub>1</sub>   |
|  |                      |     | 5. $\sim\varrho'\varrho'$ | 4, SC <sub>3</sub>   |

## ۵. منطق گزاره‌ها

### ۱.۵ سیستم اصل موضوعی

$$\varphi ::= p \mid t \mid f \mid \varphi \rightarrow \psi \mid \varphi \& \psi$$

$$\sim \varphi =_{df} \varphi \rightarrow f$$

جدول ۱.۵. دستگاه استنتاجی  $SL^{\circ e}$

(I): $\varphi \rightarrow \varphi$	(Res): $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \vdash \sim (\varphi \& \psi) \rightarrow \chi$
(R <sub>t</sub> ): $\varphi \rightarrow t \vdash \varphi$	(E): $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$
(T): $\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi \vdash \varphi \rightarrow \chi$	

معرفی شده در (Galatos and Ono 2010)، ضعیفترین «منطق زیرساختاری» است که تا کنون پیدا شده است.  $SL$  از حذف قواعد ساختاری تضعیف، انقباض، جابه‌جایی و شرکت‌پذیری از حساب رشته‌های منطق شهودی بدست می‌آید.  $SLe$  ( $SL + exchange$ ) همان  $SL$  به علاوه‌ی ویژگی جابه‌جایی برای  $\&$  است.  $SL$  به علاوه شرکت‌پذیری نیز همان منطق «لمبک کامل» ( $FL_{\perp}$ ) (Full Lambek) معرفی شده در (Galatos et al. 2007) است.

$SL^{\circ e}$  در واقع پاره‌ی ضربی  $SL$  (یعنی بدون ادات‌های شبکه  $\wedge, \vee, \perp, T$ ) است. به عبارت دیگر  $SL^{\circ e}$  ضعیفترین منطق زیرساختاری جابه‌جایی در این زبان است.

$$FL^{\circ e} =_{df} SL^{\circ e} + (a): [\varphi \& (\psi \& \chi)] \rightarrow [(\varphi \& \psi) \& \chi]$$

$$IL =_{df} L + (INV): \sim \varphi \rightarrow \varphi; \quad L \in \{SL^{\circ e}, FL^{\circ e}\}$$

در واقع همان منطق ربط  $RW$  بدون اصل پخش‌پذیری است.

جدول ۲.۵. اثبات بعضی از قواعد در سیستم اصل موضوعی  $FLe$

(MP): $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash_{SL^{\circ e}} \psi$	(N <sub>1</sub> ): $\vdash_{FL^{\circ e}} \sim (\varphi \& \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \sim \psi)$
1. $\varphi$ Pre	1. $\sim (\varphi \& \psi) \rightarrow \sim (\varphi \& \psi)$ I
2. $\varphi \rightarrow \psi$ Pre	2. $\sim [(\sim (\varphi \& \psi)) \& (\varphi \& \psi)]$ 1, Res
3. $t \rightarrow \varphi$ 1, R <sub>t</sub>	3. $[[(\sim (\varphi \& \psi)) \& \varphi] \& \psi] \rightarrow$ [ $\sim (\varphi \& \psi) \& (\varphi \& \psi)]$ a'
4. $t \rightarrow \psi$ 2,3, T	4. $\sim [[(\sim (\varphi \& \psi)) \& \varphi] \& \psi]$ 2,3, T
5. $\psi$ 4, R <sub>t</sub>	5. $[\sim (\varphi \& \psi) \& \psi] \rightarrow \sim \psi$ 4, Res 6. $\sim (\varphi \& \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \sim \psi)$ 5, Res
(e): $\vdash_{SL^{\circ e}} (\varphi \& \psi) \rightarrow (\psi \& \varphi)$	(N <sub>2</sub> ): $\vdash_{FL^{\circ e}} (\varphi \rightarrow \sim \psi) \rightarrow \sim (\varphi \& \psi)$
1. $(\psi \& \varphi) \rightarrow (\psi \& \varphi)$ I	1. $(\varphi \rightarrow \sim \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \sim \psi)$ I
2. $\psi \rightarrow [\varphi \rightarrow (\psi \& \varphi)]$ 1, Res	2. $[(\varphi \rightarrow \sim \psi) \& \varphi] \rightarrow \sim \psi$ 1, Res
3. $\varphi \rightarrow [\psi \rightarrow (\psi \& \varphi)]$ 2, E	3. $\sim [[(\varphi \rightarrow \sim \psi) \& \varphi] \& \psi]$ 2, Res
4. $(\varphi \& \psi) \rightarrow (\psi \& \varphi)$ 3, Res	4. $[(\varphi \rightarrow \sim \psi) \& (\varphi \& \psi)] \rightarrow$ [[ $(\varphi \rightarrow \sim \psi) \& \varphi] \& \psi]$ a
(M): $\varphi \rightarrow \psi \vdash_{SL^{\circ e}} (\chi \& \varphi) \rightarrow (\chi \& \psi)$	5. $\sim [(\varphi \rightarrow \sim \psi) \& (\varphi \& \psi)]$ 3,4, T
1. $\varphi \rightarrow \psi$ Pre	

## منطق تطبیقی غیرکلاسیک ۱: ... (عامر آمیخته و سیداحمد میرصانعی) ۱۵

2.	$(\psi \& \chi) \rightarrow (\chi \& \psi)$	e	6.	$(\varphi \rightarrow \sim \psi) \rightarrow \sim (\varphi \& \psi)$	5, Res
3.	$\psi \rightarrow [\chi \rightarrow (\chi \& \psi)]$	2, Res		<b>(C): <math>\vdash_{\text{FL}^{\circ}\text{e}} (\psi \rightarrow \sim \varphi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \sim \psi)</math></b>	
4.	$\varphi \rightarrow [\chi \rightarrow (\chi \& \psi)]$	1,3, T		1. $(\psi \rightarrow \sim \varphi) \rightarrow \sim (\varphi \& \psi)$	N <sub>2</sub>
5.	$\chi \rightarrow [\varphi \rightarrow (\chi \& \psi)]$	4, E		2. $(\varphi \& \psi) \rightarrow (\psi \& \varphi)$	e
6.	$(\chi \& \psi) \rightarrow (\chi \& \psi)$	5, Res		3. $\sim (\psi \& \varphi) \rightarrow \sim (\varphi \& \psi)$	2, Sf
	<b>(Sf): <math>\varphi \rightarrow \psi \vdash_{\text{SL}^{\circ}\text{e}} (\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)</math></b>			4. $(\psi \rightarrow \sim \varphi) \rightarrow \sim (\varphi \& \psi)$	1,3, T
1.	$\varphi \rightarrow \psi$	Pre		5. $\sim [(\psi \rightarrow \sim \varphi) \& (\varphi \& \psi)]$	4, Res
2.	$(\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$	I		6. $[[(\psi \rightarrow \sim \varphi) \& \varphi] \& \psi] \rightarrow$	a'
3.	$\psi \rightarrow [(\psi \rightarrow \chi) \rightarrow \chi]$	2, E		7. $\sim [[(\psi \rightarrow \sim \varphi) \& \varphi] \& \psi]$	5,6, T
4.	$\varphi \rightarrow [(\psi \rightarrow \chi) \rightarrow \chi]$	1,3, T		9. $(\psi \rightarrow \sim \varphi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \sim \psi)$	7, Res <sup>2</sup>
5.	$(\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$	4, E			
	<b>(Pf): <math>\varphi \rightarrow \psi \vdash_{\text{SL}^{\circ}\text{e}} (\chi \rightarrow \varphi) \rightarrow (\chi \rightarrow \psi)</math></b>			<b>(SC<sub>3</sub>): <math>\sim (\varphi \rightarrow \sim \psi) \vdash_{\text{FL}^{\circ}\text{e}} \sim (\psi \rightarrow \sim \varphi)</math></b>	
1.	$\varphi \rightarrow \psi$	Pre		1. $\sim (\varphi \rightarrow \sim \psi)$	Pre
2.	$(\chi \rightarrow \varphi) \rightarrow (\chi \rightarrow \varphi)$	I		2. $(\psi \rightarrow \sim \varphi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \sim \psi)$	C
3.	$[(\chi \rightarrow \varphi) \& \chi] \rightarrow \varphi$	2, Res		3. $\sim (\psi \rightarrow \sim \varphi)$	1,2, T
4.	$[(\chi \rightarrow \varphi) \& \chi] \rightarrow \psi$	1,3, T			
5.	$(\chi \rightarrow \varphi) \rightarrow (\chi \rightarrow \psi)$	4, Res		<b>(N<sub>4</sub>): <math>\vdash_{\text{FL}^{\circ}\text{e}} (\varphi \&amp; \sim \psi) \rightarrow \sim (\varphi \rightarrow \psi)</math></b>	
	<b>(a'): <math>\vdash_{\text{FL}^{\circ}\text{e}} [(\varphi \&amp; \psi) \&amp; \chi] \rightarrow [\varphi \&amp; (\psi \&amp; \chi)]</math></b>			1. $(\varphi \rightarrow \sim \psi) \rightarrow \sim (\varphi \& \psi)$	N <sub>2</sub>
1.	$[(\varphi \& \psi) \& \chi] \rightarrow [\chi \& (\varphi \& \psi)]$	e		2. $(\varphi \& \psi) \rightarrow \sim (\varphi \rightarrow \sim \psi)$	1, E
2.	$(\varphi \& \psi) \rightarrow (\psi \& \varphi)$	e			
3.	$[\chi \& (\varphi \& \psi)] \rightarrow [\chi \& (\psi \& \varphi)]$	2, M		<b>(N<sub>7</sub>): <math>\vdash_{\text{IFL}^{\circ}\text{e}} \sim (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \&amp; \sim \psi)</math></b>	
4.	$[\chi \& (\psi \& \varphi)] \rightarrow [(\chi \& \psi) \& \varphi]$	a		1. $\sim (\varphi \& \sim \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \sim \psi)$	N <sub>1</sub>
5.	$[(\chi \& \psi) \& \varphi] \rightarrow [\varphi \& (\chi \& \psi)]$	e		2. $[\sim (\varphi \& \sim \psi) \& \varphi] \rightarrow \sim \psi$	1, Res
6.	$(\chi \& \psi) \rightarrow (\psi \& \chi)$	e		3. $\sim \psi \rightarrow \psi$	INV
7.	$[\varphi \& (\chi \& \psi)] \rightarrow [\varphi \& (\psi \& \chi)]$	6, M		4. $[\sim (\varphi \& \sim \psi) \& \varphi] \rightarrow \psi$	2,3, T
8.	$[(\varphi \& \psi) \& \chi] \rightarrow [\varphi \& (\psi \& \chi)]$	1,3,4,		5. $\sim (\varphi \& \sim \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$	4, Res
		5,7, T <sup>4</sup>		6. $\sim (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \sim (\varphi \& \sim \psi)$	5, Sf
				7. $\sim \sim (\varphi \& \sim \psi) \rightarrow (\varphi \& \sim \psi)$	INV
				8. $\sim (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \& \sim \psi)$	6,7, T

## ۲.۵ معناشناسی جبری مرتب جزئی

یک «گروهوار مرتب جزئی ماندهای جابه‌جایی نقطه‌دار با یکه» (pointed commutative

ساختار) یا به طور خلاصه یک  $\text{SL}^{\circ}\text{e}$ -ساختار (residuated partially ordered groupoid with unit

یک ۶-تایی مرتب  $\mathcal{A} = \langle A, \leq, \&, \rightarrow, f, t \rangle$  است، به طوری که  $f \in A$  و  $t \in A$

- یک مجموعه مرتب جزئی است.  $\Leftrightarrow \langle A, \leq \rangle$

- یک گروهوار یکه‌دار جابه‌جایی است.  $\langle A, \&, t \rangle$

$x \leq y \rightarrow z \Leftrightarrow x \& y \leq z$

: (residuation)

یک  $\text{SL}^{\circ}\text{e}$ -مدل دو تایی  $\mathfrak{M} = \langle \mathcal{A}, I \rangle$  است به طوری که  $\mathcal{A}$  یک  $\text{SL}^{\circ}\text{e}$ -ساختار و  $I$  یک

تابع از مجموعه متغیرها (جمله‌نشانه‌ها) به  $A$  است.

برای هر  $\mathfrak{M}$ -مدل  $\mathfrak{M}$  یک  $SL^e$ -ارزشده‌ی یک تابع مثل  $V_{\mathfrak{M}}$  از مجموعه‌ی فرمول‌ها به است به طوری که:

- $V_{\mathfrak{M}}(p) = I(p)$   $p \in Var$
- $V_{\mathfrak{M}}(c) = c$   $c \in \{f, t\}$
- $V_{\mathfrak{M}}(\varphi * \psi) = V_{\mathfrak{M}}(\varphi) * V_{\mathfrak{M}}(\psi)$   $* \in \{\rightarrow, \&\}$

و در آخر تعریف استدلال معتبر:

- $\mathfrak{M} \models \varphi \Leftrightarrow_{df} t \leq V_{\mathfrak{M}}(\varphi)$  (صدق در مدل)
- $\Psi \models \varphi \Leftrightarrow_{df} \forall \mathfrak{M}: \forall \psi \in \Psi, \mathfrak{M} \models \psi \Rightarrow \mathfrak{M} \models \varphi$

به علاوه  $SL^e$ -ساختار  $\mathcal{A}$  یک

- $FL^e$ -ساختار است اگر و تنها اگر & شرکت‌پذیر باشد.
- $ISL^e$ -ساختار است اگر و تنها اگر  $x \leq x$ .
- $IFL^e$ -ساختار است اگر و تنها اگر  $FL^e$ -ساختار و  $ISL^e$ -ساختار باشد.

قضیه ۲: برای هر  $\Gamma \models_L \varphi \Leftrightarrow \Gamma \vdash_L \varphi : L \in \{SL^e, FL^e, ISL^e, IFL^e\}$

سمت راست به چپ (صحت قوی) به سادگی به صورت استاندارد یعنی از طریق استقراء قوی با اثبات معتبر بودن اصول موضوعه و صدق نگه‌داری قواعد بدست می‌آید.  
سمت چپ به راست (تمامیت جبری قوی) نیز به شکل استاندارد از طریق جبر لیندون باوم (Lindenbaum algebra) با تعریف زیر اثبات می‌شود:

- $[\varphi]_{\Gamma}^L =_{df} \{\psi \in Fm | \Gamma \vdash_L \varphi \rightarrow \psi, \Gamma \vdash_L \psi \rightarrow \varphi\}$
- $L_{\Gamma} =_{df} \{[\varphi]_{\Gamma}^L | \varphi \in Fm\}, \quad [\varphi]_{\Gamma}^L \leq_{\Gamma}^L [\psi]_{\Gamma}^L \Leftrightarrow_{df} \Gamma \vdash_L \varphi \rightarrow \psi$
- $c_{\Gamma}^L =_{df} [c]_{\Gamma}^L; c \in \{f, t\}, \quad *_{\Gamma}^L ([\varphi]_{\Gamma}^L, [\psi]_{\Gamma}^L) =_{df} [\varphi * \psi]_{\Gamma}^L; * \in \{\rightarrow, \&\}$
- $LN_{\Gamma}^L =_{df} \langle L_{\Gamma}^L, \leq_{\Gamma}^L, \&_{\Gamma}^L, \rightarrow_{\Gamma}^L, f_{\Gamma}^L, t_{\Gamma}^L \rangle$

البته در نتیجه فلسفی که در نهایت خواهیم گرفت، فراقضیه صحت قوی برای ما کفايت می‌کند و نیازی به تمامیت نداریم. (برای نشان دادن استدلال‌های اثبات‌ناپذیر)

## ۶. منطق محمولات مرتبه اول یک موضعی

زبان صوری منطق‌های این قسمت همان زبان صوری استاندارد «منطق مرتبه اول یک موضعی» بر پایه زبان صوری منطق‌های گزاره‌ای قبل است.  $\mathcal{C}$  و  $\mathcal{X}$  را به ترتیب مجموعه‌های ناتهی شمارا از ثابت‌های فردی و متغیرهای فردی بگیرید.

$$- \quad \varphi ::= f \mid t \mid Aa \mid Ax \mid \varphi \& \psi \mid \varphi \rightarrow \psi \mid \forall \alpha \varphi_\alpha \mid \exists \alpha \varphi_\alpha; \quad a \in \mathcal{C}, x, \alpha \in \mathcal{X}, A \in \mathcal{P}$$

اگر  $\psi$  فاقد مورد آزاد  $\alpha$  باشد، می‌نویسیم  $\psi \notin \alpha$ . مجموعه‌ی همه‌ی این فرمول‌ها را با  $Fm_Q$  نشان می‌دهیم.

جدول ۱.۶. ترجمه استاندارد گزاره‌های حملی

$AaB = \forall x(Ax \rightarrow Bx)$	$AiB = \exists x(Ax \& Bx)$
$AeB = \forall x(Ax \rightarrow \sim Bx)$	$AoB = \exists x(Ax \& \sim Bx)$

## ۱.۶ سیستم اصل موضوعی

- $LQ =_{df} L + (\forall I): \forall \alpha \varphi_\alpha \rightarrow \varphi_\beta + (\exists I): \varphi_\beta \rightarrow \exists \alpha \varphi_\alpha + (\forall I): \varphi \vdash \forall \alpha \varphi_\alpha + (\forall 2): \forall \alpha(\psi \rightarrow \varphi_\alpha) \rightarrow (\psi \rightarrow \forall \alpha \varphi_\alpha) + (\exists 2): \forall \alpha(\varphi_\alpha \rightarrow \psi) \rightarrow (\exists \alpha \varphi_\alpha \rightarrow \psi); \quad \alpha \notin \psi$
  - $LQ^* =_{df} LQ + (I^*): \exists \alpha(\varphi_\alpha \& \varphi_\alpha) + (I^{**}): \exists \alpha(\sim \varphi_\alpha \& \sim \varphi_\alpha); \quad \varphi \in \mathcal{P}$
- |                            |                              |                             |                               |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| $Q7 =_{df} SL^{\circ} eQ$  | $Q8 =_{df} SL^{\circ} eQ^*$  | $Q9 =_{df} ISL^{\circ} eQ$  | $Q10 =_{df} ISL^{\circ} eQ^*$ |
| $Q11 =_{df} FL^{\circ} eQ$ | $Q12 =_{df} FL^{\circ} eQ^*$ | $Q13 =_{df} IFL^{\circ} eQ$ | $Q14 =_{df} IFL^{\circ} eQ^*$ |

جدول ۲.۶. اثبات بعضی از قواعد در Q5

(M\forall): \varphi \rightarrow \psi \vdash_Q \forall \alpha \varphi \rightarrow \forall \alpha \psi		(M\exists): \varphi \rightarrow \psi \vdash_Q \exists \alpha \varphi \rightarrow \exists \alpha \psi	
1. $\varphi_\beta \rightarrow \psi_\alpha$	Pre	1. $\varphi_\alpha \rightarrow \psi_\beta$	Pre
2. $\forall \alpha \varphi_\alpha \rightarrow \varphi_\beta$	$\forall I$	2. $\psi_\alpha \rightarrow \exists \alpha \psi_\alpha$	$\forall I$
3. $\forall \alpha \varphi_\alpha \rightarrow \psi_\alpha$	1,2, T	3. $\varphi_\alpha \rightarrow \exists \alpha \psi_\alpha$	1,2, T
4. $\forall \alpha(\forall \alpha \varphi_\alpha \rightarrow \psi_\alpha)$	3, $\forall I$	4. $\forall \alpha(\varphi_\alpha \rightarrow \exists \alpha \psi_\alpha)$	3, $\forall I$
5. $\forall \alpha(\forall \alpha \varphi_\alpha \rightarrow \psi_\alpha) \rightarrow (\forall \alpha \varphi_\alpha \rightarrow \forall \alpha \psi_\alpha)$	$\forall 2$	5. $\forall \alpha(\varphi_\alpha \rightarrow \exists \alpha \psi_\alpha) \rightarrow (\exists \alpha \varphi_\alpha \rightarrow \exists \alpha \psi_\alpha)$	$\forall 2$
6. $\forall \alpha \varphi_\alpha \rightarrow \forall \alpha \psi_\alpha$	4,5, MP	6. $\exists \alpha \varphi_\alpha \rightarrow \exists \alpha \psi_\alpha$	4,5, MP
(E3): $\varphi_\alpha \rightarrow \psi \vdash_Q \exists \alpha \varphi_\alpha \rightarrow \psi; \alpha \notin \psi$		(E4): $\sim \varphi_\alpha \vdash_Q \sim \exists \alpha \varphi_\alpha$	
1. $\varphi_\alpha \rightarrow \psi$	Pre	1. $\sim \varphi_\alpha$	Pre
2. $\forall \alpha(\varphi_\alpha \rightarrow \psi)$	1, $\forall I$	2. $\forall \alpha \sim \varphi_\alpha \rightarrow \sim \varphi_\alpha$	$\forall I$
3. $\forall \alpha(\varphi_\alpha \rightarrow \psi) \rightarrow (\exists \alpha \varphi_\alpha \rightarrow \psi)$	$\exists 2$	3. $\varphi_\alpha \rightarrow \sim \forall \alpha \sim \varphi_\alpha$	2, E
4. $\exists \alpha \varphi_\alpha \rightarrow \psi$	2,3, MP	4. $\exists \alpha \varphi_\alpha \rightarrow \sim \forall \alpha \sim \varphi_\alpha$	3, $\exists 3$
(E5): $\forall \alpha \varphi_\alpha \vdash_Q \varphi_\beta$		6. $\forall \alpha \sim \varphi_\alpha$	
1. $\forall \alpha \varphi_\alpha$	Pre	7. $\sim \exists \alpha \varphi_\alpha$	5,6, MP

2.	$\forall \alpha \varphi_\alpha \rightarrow \varphi_\beta$	$\forall 1$			
3.	$\varphi_\beta$	1,2, MP			
			(35): $\exists \alpha \sim \varphi_\alpha \vdash_{Q7} \sim \forall \alpha \varphi_\alpha$		
1.			$\exists \alpha \sim \varphi_\alpha$	Pre	
2.			$\forall \alpha \varphi_\alpha \rightarrow \varphi_\alpha$	$\forall 1$	
3.			$\sim \varphi_\alpha \rightarrow \sim \forall \alpha \varphi_\alpha$	2, Sf	
4.			$\exists \alpha \sim \varphi_\alpha \rightarrow \sim \forall \alpha \varphi_\alpha$	3, $\exists 3$	
5.			$\sim \forall \alpha \varphi_\alpha$	1,4, MP	

## ۲.۶ اثبات منطق حملی در منطق محمولات یک موضوعی

S را یک تابع از  $\mathcal{X} \times \mathcal{P}'$  به  $Fm_Q$  با ضابطه زیر بگیرید:

$$S_x \varphi =_{df} S(x, \varphi)$$

$$S_x \varphi = \varphi x; \varphi \in \mathcal{P}$$

$$S_x \pi' = \sim S_x \pi$$

T را یک تابع از  $Fm_C$  به  $Fm_Q$  با ضابطه زیر بگیرید:

$$T(\pi \alpha \rho) = \forall x(S_x \pi \rightarrow S_x \rho)$$

$$T(\pi e \rho) = \forall x(S_x \pi \rightarrow \sim S_x \rho)$$

$$T(\pi i \rho) = \forall x(S_x \pi \& S_x \rho)$$

$$T(\pi o \rho) = \forall x(S_x \pi \& \sim S_x \rho)$$

$$T(\sim \varphi) = \sim T(\varphi)$$

قضیه ۳: برای هر  $\{T(\psi) | \psi \in \Psi\} \vdash_{Qi} T(\varphi)$  و  $\Psi \cup \{\varphi\} \subseteq Fm_C$  و  $i \in \{7, \dots, 14\}$  با استقراء تنها کافی است که تمام اصول و قواعد  $Ci$  در  $Qi$  اثبات شوند.

### جدول ۲.۶. اثبات قواعد اصلی منطق حملی

		1	2	3	4	5	6
Q7	$\forall x(Ax \rightarrow Ax)$	I	$1, \forall 1$				
Q7	$\forall x(Ax \rightarrow Bx), \forall x(Bx \rightarrow Cx) \vdash \forall x(Ax \rightarrow Cx)$	Pre	Pre	$1, \forall E$	$2, \forall E$	$3, 4, T$	$5, \forall 1$
Q7	$\forall x(Ax \rightarrow \sim Bx) \vdash \forall x(Bx \rightarrow \sim Ax)$	Pre	$1, \forall E$	$2, E$	$3, \forall I$		
Q7	$\exists x(Ax \& Bx), \forall x(Bx \rightarrow Cx) \vdash \exists x(Ax \rightarrow Cx)$	Pre	Pre	$1, \forall E$	$3, M$	$4, M \exists$	$1, 5, MP$
Q9	$\forall x(\sim \sim Ax \rightarrow Ax)$	I	$1, \forall 1$				
Q7	$\forall x(Bx \rightarrow Ax), \sim \forall x(Bx \rightarrow Cx) \vdash \sim \forall x(Ax \rightarrow Cx)$	Pre	Pre	$1, \forall E$	$3, Sf$	$4, M \forall$	$5, T$
Q7	$\sim \forall x(Ax \rightarrow Bx), \forall x(Cx \rightarrow Bx) \vdash \sim \forall x(Ax \rightarrow Cx)$	Pre	Pre	$1, \forall E$	$3, Pf$	$4, M \forall$	$5, T$
Q7	$\sim \exists x(Ax \& Bx), \forall x(Ax \rightarrow \sim Bx) \vdash \forall x(Ax \rightarrow \sim Bx)$	Pre	$\exists I$	$1, 2, T$	$3, Res$	$4, \forall I$	
Q7	$\forall x(Ax \rightarrow \sim Bx) \vdash \sim \exists x(Ax \& Bx)$	Pre	$1, \forall E$	$2, Res$	$3, \exists 4$		
Q11	$\sim \forall x(Ax \rightarrow \sim Bx) \vdash \sim \forall x(Bx \rightarrow \sim Ax)$	Pre	C	$2, M \forall$	$1, 3, T$		

منطق تطبیقی غیرکلاسیک ۱: ... (عامر آمیخته و سیداحمد میرصانعی) ۱۹

Q11	$\exists x(Ax \& \sim Bx) \vdash \sim \forall x(Ax \rightarrow Bx)$	Pre	N <sub>4</sub>	2,M $\exists$	1,3,MP	4, $\exists I$
Q13	$\sim \forall x(Ax \rightarrow Bx) \vdash \exists x(Ax \& \sim Bx)$	Pre	1, $\forall E$	N <sub>7</sub>	2,3,MP	

تا اینجا حکم را برای Q7,Q9,Q11,Q13 ثابت کردیم. حالا برای بقیه سیستم‌ها کافی است که فراقضیه‌ی زیر را ثابت کنیم:

$$(I^*_n): \vdash_{Q8} \exists \alpha (\sim^n A\alpha \& \sim^n A\alpha); \quad \sim^0 \phi =_{df} \phi, \quad \sim^{n+1} \phi =_{df} \sim^n \phi$$

با استقراء روی  $2n + 1$  ثابت می‌کنیم. گام‌های بنیادین از اصول  $(I^*)$  و  $(I^{**})$  بدست می‌آید. برای گام‌های استقراء نیز تنها کافی است که قاعده‌ی زیر ثابت شود:

$$\exists \alpha (\varphi_a \& \varphi_a) \vdash_{Q8} \exists \alpha (\sim \varphi_a \& \sim \varphi_a)$$

برای این منظور با  $(M\exists)$  و  $(MP)$  کافی است که ثابت شود که:

$$\vdash_{SL^e} (p \& p) \rightarrow (\sim p \& \sim p)$$

اثبات ساده است. ابتدا با اعمال  $(E)$  روی  $p \rightarrow \sim p$  به  $\sim p \rightarrow \sim p$  می‌رسیم. سپس با  $(M)$  به  $(p \& p) \rightarrow (p \& \sim p)$  می‌رسیم. از طرف دیگر با  $(T)$ ,  $(e)$ ,  $(M)$  به  $(\sim p \& \sim p) \rightarrow (p \& \sim p)$  می‌رسیم. در نهایت با  $(T)$  فرمول مذبور اثبات می‌شود.  
مسئله باز ۲: آیا  $Ci$ ‌ها پاره‌ای از  $Qi$ ‌ها هستند؟

### ۳.۶ معناشناسی فرگهای

یک LQ-مدل یک ۴-تایی مرتب  $\mathfrak{M} = \langle \mathcal{A}, D, P, I \rangle$  است به طوری که

-  $\mathcal{A}$  یک L-ساختار است به شرطی که  $\leqslant$  کامل (complete) باشد.

(یعنی:  $(\forall B \subseteq A: \text{sup } B \in A \& \text{inf } B \in A)$ )

-  $D$  یک مجموعه‌ی ناتهی به نام دامنه است.

-  $P$  یک مجموعه از «تابع از  $D$  به  $A$ » است.

-  $I$  یک تابع به صورت زیر است:

$$I: \mathcal{C} \rightarrow D$$

$$I: \mathcal{P} \rightarrow P$$

برای هر LQ-مدل  $\mathfrak{M}$  تابع  $\mathcal{C} \cup \{\bar{o} | o \in D\} \rightarrow D$  را با ضابطه‌ی زیر بگیرید:

$$[\bar{o}]_{\mathfrak{M}} = \begin{cases} I(\bar{o}), & \bar{o} \in \mathcal{C} \\ o, & \bar{o} \notin \mathcal{C} \end{cases}$$

$P$  را مجموعه‌ی همه‌ی گزاره‌ها (فرمول‌های بدون متغیر آزاد) در  $Fm_Q$  بگیرید، تنها با این تفاوت که  $C \cup \{\bar{o} | o \in D\}$  جایگزین  $C$  شود.

برای هر  $LQ$ -مدل  $\mathfrak{M}$  یک  $LQ$ -ارزشده‌ی یک تابع  $V_{\mathfrak{M}}: P \rightarrow A$  است به طوری که:

- $V_{\mathfrak{M}}(c) = c; \quad c \in \{t, f\} \quad V_{\mathfrak{M}}(\varphi * \psi) = V_{\mathfrak{M}}(\varphi) * V_{\mathfrak{M}}(\psi); \quad * \in \{\rightarrow, \&\}$
- $V_{\mathfrak{M}}(\varphi \bar{o}) = I(\varphi)([\bar{o}]_{\mathfrak{M}})$
- $V_{\mathfrak{M}}(\forall \alpha \varphi_a) = \inf\{V_{\mathfrak{M}}(\varphi_{\bar{o}}) \mid \bar{o} = [\bar{o}]_M, o \in D\}$
- $V_{\mathfrak{M}}(\exists \alpha \varphi_a) = \sup\{V_{\mathfrak{M}}(\varphi_{\bar{o}}) \mid \bar{o} = [\bar{o}]_M, o \in D\}$

فرض کنید فرمول  $\varphi$  دقیقاً شامل متغیرهای فردی  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  باشد به طوری که  $\varphi$  شامل

$$Cl(\varphi) =_{df} \forall \alpha_1 \dots \forall \alpha_n \varphi \quad \text{هیچ } \forall \alpha_i \text{ و } \exists \alpha_j \text{ نباشد.}$$

در نهایت تعریف استدلال معتبر:

- $\mathfrak{M} \models \varphi \iff_{df} t \leq V_{\mathfrak{M}}(Cl(\varphi)) \quad (\text{صدق در مدل})$
- $\Psi \models \varphi \iff_{df} \forall \mathfrak{M}: \forall \psi \in \Psi, \mathfrak{M} \models \psi \Rightarrow \mathfrak{M} \models \varphi$

یک  $LQa$ -مدل یک  $LQa$ -مدل است اگر و تنها اگر دارای دو ویژگی زیر باشد:

$$(R_{I*}): t \leq \sup\{p(o) \& p(o) \mid p \in P, o \in D\}$$

$$(R_{I**}): t \leq \sup\{\sim p(o) \& \sim p(o) \mid p \in P, o \in D\}$$

توجه کنید که اگر  $A$  متناهی باشد، این دو ویژگی به صورت زیر ساده می‌شوند:

$$\forall p \in P \exists o \in D: t \leq p(o) \& p(o), t \leq \sim p(o) \& \sim p(o)$$

$$\Gamma \vdash_{AL} \varphi \Rightarrow \Gamma \models_L \varphi \quad L \in \{Q7, \dots, Q14\} \quad \text{قضیه ۴: برای هر } L \in \{Q7, \dots, Q14\}$$

به سادگی به صورت استاندارد ثابت خواهد شد و نکته‌ی فنی خاصی ندارد.

#### ۴.۶ عدم تعهد وجودی به نام‌های عام در C14

ابتدا یک  $Q14$ -مدل معرفی می‌کنیم.  $D$  را مجموعه‌ی همه‌ی موجودات بگیرید. بنابراین در این مدل نسب به اسامی خاص تعهد وجودی داریم. اما نشان می‌دهیم که در این مدل همچنان تعهد وجودی نسبت به نام‌های عام نداریم. توجه کنید که تعبیر سورها وجودی است. مانند منطق کلاسیک و نه منطق آزاد.

منطق تطبیقی غیرکلاسیک ۱: ... (عامر آمیخته و سیداحمد میرصانعی) ۲۱

$\mathcal{A}$  را ساختار حاصل از معناشناسی چهارازشی منطق ربط KR (معناشناسی چرج) بگیرید. (فلاحتی ۱۳۹۱، ۲۴۹-۲۵۳)

		$A = \{\perp, f, t, T\}, \perp \leq f \leq T, \perp \leq t \leq T$				
		$\rightarrow$	$\perp$	$f$	$t$	$T$
$\perp$	$\sim$	$\perp$	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$
	$f$	$f$	$\perp$	$t$	$\perp$	$T$
	$t$	$t$	$\perp$	$f$	$t$	$T$
	$T$	$T$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$T$

توجه کنید که  $t \leq f \& f = T$  است اما  $t \leq f$  نیست.

$\exists x Bx$  و  $a$  را به ترتیب محمول‌های «انسان»، «دیو» و نام «عامر» بگیرید. بنابراین  $\exists x Bx$  شهوداً تعبیر می‌شود که «دیو وجود دارد». حالا قرار دهید:

- $I(A) = \mathbb{A} \quad I(a) = \mathfrak{a} \quad I(B) = \mathbb{B}$
  - $\mathbb{A}(o) = \begin{cases} T, & o \in \{\text{Humans}\} \\ \perp, & o \notin \{\text{Humans}\} \end{cases} \quad \mathbb{B}(o) = \begin{cases} f, & o = \mathfrak{a} \\ \perp, & o \neq \mathfrak{a} \end{cases}$
- در این مدل  $t = f \leq t$ . بنابراین در این مدل:

- گزاره‌های «بعضی دیوها دیو هستند» و «بعضی دیوها انسان هستند» ارزش صدق  $T$  می‌گیرند. در حالی که
- گزاره‌های «دیو وجود دارد» و «عامر دیو است» ارزش کذب  $f$  می‌گیرند.

مسئله باز ۳: دقیقاً چند منطق ۴ ارزشی  $IFL^{\circ}e \subseteq L$  با زبان  $\{\rightarrow, \&, f, t\}$  وجود دارد که  $\nexists \nexists_{ALQa} \exists x Ax$

## ۵.۶ افزودن محمول وجود مرتبه اول

$E!$  را یک محمول نشانه‌ی خاص بگیرید. یعنی قرار دهید  $E! \in \mathcal{P}$ .  $E!$  را شهوداً محمول وجود تعبیر کنید. بنابراین جمله‌های مهمهای «انسان وجود دارد» و «انسان موجود است» را به یکی از دو صورت زیر می‌توان ترجمه کرد:

۱. هر انسان موجود است:  $AaE!, \forall x(Ax \rightarrow E!x)$
۲. بعضی انسان‌ها موجود هستند:  $AiE!, \exists x(Ax \& E!x)$

حالا اصل «هر چیزی (شی‌ای) موجود است» را به صورت زیر اضافه می‌کنیم:

- $AQ15 =_{df} AQ14 + (E!): \forall \alpha E!\alpha$

- یک Q14-مدل یک Q15-مدل است اگر و تنها اگر  $\forall o \in D: t \leq E!o$

بنابراین در Q15 ما صریحاً نسبت به نامهای خاص تعهد وجودی داریم. حالا برای این که نشان دهیم C14 فاقد تعهد وجودی نسبت به نامهای عام است، کافی است که نشان دهیم:  $\nexists_{Q15} \exists x (Bx \& E!x)$

همان مدل زیرقسمت قبل را در نظر بگیرید به علاوه اینکه:

-  $I(E!) = \mathbb{E}$ ,  $E(o) = \begin{cases} t, & o = a \\ T, & o \neq a \end{cases}$  داریم؛ بنابراین  $\sup\{\perp \& T, f \& t\} = f$  در Q15 اثبات ناپذیر است.

## ۶.۶ عدم تعهد به عدم نامهای عام

در مدل گفته شده برای Q15، هر دو فرمول  $\exists x \sim E!x$  و  $\exists x (\sim E!x \& E!x)$  ارزش کذب f دارند. بنابراین تمام سیستم‌های گفته شده در این مقاله نه به وجود نامهای عام و نه به عدم وجود نامهای عام تعهد دارند.

## ۷.۶ منطق‌های نیمه‌خطی

مهم‌ترین ویژگی منطق‌های فازی «نیمه‌خطی» (semilinear) بودن آن است. یک منطق را نیمه‌خطی می‌نامند اگر و تنها اگر نسبت به یک زنجیر (chain) به طور قوی صحیح و تمام باشد. در هر زنجیر  $\triangleleft_A$  داریم:

قضیه ۵: L را یک گسترش نیمه‌خطی از Q8 بگیرید:

در (Cintula and Noguera 2010) ثابت شده است که L دارای ویژگی زیر است:

(SLP):  $\Gamma, \varphi \rightarrow \psi \vdash_L \chi$  and  $\Gamma, \psi \rightarrow \varphi \vdash_L \chi \Rightarrow \Gamma \vdash_L \chi$

$\exists x A x \rightarrow t \vdash_L \exists x A x$		بنابراین تنها کافی است ثابت شود که:	
1.	$\exists x A x \rightarrow t$	Pre	7. $A x \rightarrow (t \rightarrow A x)$ 6, E
2.	$A x \rightarrow \exists x A x$	$\exists I$	8. $(A x \& t) \rightarrow A x$ 7, Res
3.	$(\exists x A x \rightarrow t) \rightarrow (A x \rightarrow t)$	2, Sf	9. $(A x \& A x) \rightarrow A x$ 5,8, T
4.	$A x \rightarrow t$	1,3, MP	10. $\exists x (A x \& A x) \rightarrow \exists x A x$ 9, M $\exists$
5.	$(A x \& A x) \rightarrow (A x \& t)$	4, M	11. $\exists x (A x \& A x)$ I*
6.	$t \rightarrow (A x \rightarrow A x)$	I <sub>t</sub>	12. $\exists x A x$ 10,11, MP

بنابراین هر کدام از گسترش‌های نیمه‌خطی Q8 به نامهای عام تعهد وجودی دارند.

## ۷. نتیجه‌گیری

بعضی از منطق‌های غیرکلاسیک برای بررسی و تحلیل منطق سنتی و قیاسات ارسطویی نسبت به منطق کلاسیک کارآمدتر هستند. ضمن اینکه دیگر نیازی به بسیاری از قواعد کلاسیک که تبعات فلسفی فراوانی در نحو و معناشناسی دارند، نخواهیم داشت. به عنوان مثال نشان دادیم که برای اثبات قیاس‌های حملی ارسطویی نه نیازی به برهان خلف، نه نیازی به قواعد  $\neg\neg\perp\perp$  و  $\neg\neg\perp\perp$ ، و نه نیازی به قواعد فرض داریم.

در این مقاله، سیستم اصل موضوعی C8 برای تمام ۲۴ ضرب قوی و ضعیف قیاس‌های ارسطویی به علاوه اصل «هر الف الف است». و قواعد نقض المحمول سالبه‌ها معرفی شد. C8 تنها شامل ضروب Barbara و Datisi بوده و صرفاً با «۲ اصل» و «۵ قاعده‌ی یک مقدمه‌ای» اصل‌بندی شد. نشان دادیم که C10 به طور کامل شامل تمام قواعد عکس و نقض در منطق مظفر و C12 شامل مربع تقابل اما فاقد حذف نقض مضاعف است. قوی‌ترین منطق حملی این مقاله یعنی C14 نیز، فاقد قواعد غیربرطی منطق کلاسیک است. در نهایت، با بهره‌گیری از منطق گزاره‌های IFL<sub>e</sub> و معناشناسی ۴ ارزشی منطق ربطی-کلاسیک قوی KR، عدم تعهد وجودی نسبت به نام‌های عام در C14 نشان داده شد. این ادعا با همان «تعییر وجودی از سورها»، «تعهد وجودی نسبت به نام‌های خاص» و «ترجمه‌ی استاندارد محصورات اربعه» در منطق فرگه ثابت شد.

در مقاله‌ی بعدی با استفاده از

۱. منطق مرتبه اول بر پایه IFL<sub>e</sub> بدون اصول (I\*) و (I\*\*)
  ۲. تعمیم ترجمه‌های غیراستاندارد محصورات اربعه در (فلحی ۱۳۸۹)
- بعضی توانایی‌های دیگر IFL<sub>e</sub> را برای تحلیل منطق حملی نشان می‌دهیم.

## کتاب‌نامه

- حیدری، داود. ۱۳۸۹. «نظریه قیاس ارسطویی از دیدگاه لوکاسیه‌ویچ». مجله پژوهش‌های فلسفی دانشگاه تبریز ۴ (۲۱۶): ۲۹-۱. [https://philosophy.tabrizu.ac.ir/article\\_360.html](https://philosophy.tabrizu.ac.ir/article_360.html).
- فلحی، اسدالله. ۱۳۸۷. «قاعده فرعیه در منطق جدید، گزارشی انتقادی از نزاع پنجاه ساله منطق قدیم و جدید درباره پیش‌فرض وجودی در ایران». آینه معرفت، no. 15: 41-66.
- فلحی، اسدالله. ۱۳۸۹. «منطق‌های مبتنی بر عکس نقض و نقض محمول». منطق‌پژوهی ۱ (۱): ۱۱۳-۱۴۲.

فلاحی، اسدالله. ۱۳۹۱. آشنایی با منطق ربط. تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

نبوی، لطف الله. ۱۳۷۶. "منطق حملی بر اساس ضرب Ferio." مدرسان علوم انسانی، ۵ no. 5.

نبوی، لطف الله. ۱۳۸۵. تراز اندیشه. تهران: انتشارات بصیرت.

- Cintula, Petr, and Carles Noguera. 2010. "Implicational (Semilinear) Logics I: A New Hierarchy." *Archive for Mathematical Logic* 49 (4): 417–46. <https://doi.org/10.1007/s00153-010-0178-7>.
- Galatos, Nikolaos, Peter Jipsen, Tomasz Kowalski, and Hiroakira Ono. 2007. *Residuated Lattices: An Algebraic Glimpse at Substructural Logics*. Vol. 151. Elsevier.
- Galatos, Nikolaos, and Hiroakira Ono. 2010. "Cut Elimination and Strong Separation for Substructural Logics: An Algebraic Approach." *Annals of Pure and Applied Logic* 161 (9): 1097–1133. <https://doi.org/10.1016/j.apal.2010.01.003>.
- Kulicki, Piotr. 2020. "Aristotle's Syllogistic as a Deductive System." *Axioms* 9 (2): 56. <https://doi.org/10.3390/AXIOMS9020056>.
- Lukasiewicz, J. 1957. Aristotle's Syllogistic from the Standpoint of Modern Formal Logic. 2nd ed. Oxford University Press. <https://books.google.com/books?id=6PWXyQEACAAJ>.